



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ДИАЗОЛИН®
DIAZOLINE®

Торговое название препарата: Диазолин®

Действующее вещество (МНН): мебгидролин (mehbhydrolin)

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

1 таблетка содержит:

активное вещество: мебгидролина в пересчете на 100% вещество 100 мг (0,1 г);

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, повидон, сахароза, кальция стеарат.

Описание: таблетки круглой формы с плоской поверхностью с риской и фаской, белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: антигистаминные средства для системного применения.

Код АТХ: R06AX15.

Фармакологические свойства

Мебгидролин относится к антигистаминным препаратам, является блокатором H₁-рецепторов гистамина. Мебгидролин ослабляет спазмогенный эффект гистамина в отношении гладких мышц бронхов, кишечника, а также его влияние на проницаемость сосудов. В отличие от антигистаминных препаратов первого поколения (димедрол, супрастин) имеет менее выраженный седативный и снотворный эффект. Обладает слабовыраженными м-холиноблокирующими и анестезирующими свойствами.

Быстро всасывается из пищеварительного тракта. Биодоступность колеблется в пределах 40-60%. Терапевтический эффект развивается спустя 15-30 минут, максимальное действие наблюдается через 1-2 часа. Продолжительность эффекта может достигать 2 суток. Препарат практически не проникает через гематоэнцефалический барьер, метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует ферменты печени, выводится из организма почками.

Показания к применению

Профилактика и лечение сезонного и аллергического ринита, поллиноза, крапивницы, пищевой и лекарственной аллергии, дерматозов, сопровождающихся кожным зудом (экзема, нейродермит).

Способ применения и дозы

Диазолин® назначать внутрь, после еды, взрослым и детям старше 12 лет по 100-200 мг 1-2 раза в сутки. Высшие дозы для взрослых: разовая – 300 мг, суточная – 600 мг.

Детям 5-12 лет – по 50 мг 1-3 раза в сутки; детям 3-5 лет – по 25-50 мг 1-3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания, клинического эффекта и переносимости препарата.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: Диазолин® может раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, что иногда проявляется диспептическими явлениями (изжога, тошнота, боль в эпигастриальной области).

Со стороны нервной системы: головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, сонливость, нечеткость зрительного восприятия, замедление скорости реакций, тремор, тревожность (ночью), раздражительность.

Другие: сухость во рту, нарушения мочеиспускания, аллергические реакции. Крайне редко возможно возникновение гранулоцитопении и агранулоцитоза.

У детей иногда наблюдаются парадоксальные реакции: повышенная возбудимость, тремор, нарушения сна.

В единичных случаях в пострегистрационном периоде отмечались следующие побочные реакции: головная боль, зуд, высыпания, крапивница, отек Квинке.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, пилоростеноз, гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, эпилепсия, нарушения сердечного ритма (имея ваготоническое действие, может улучшать АВ-проводимость и способствовать развитию наджелудочковых аритмий).

Лекарственные взаимодействия

Диазолин® потенцирует действие снотворных, седативных и других препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также алкоголя.

Особые указания

Диазолин® с осторожностью назначают при тяжелой печеночной и/или почечной недостаточности (возможна коррекция дозы и увеличение интервалов между приемами). Во время лечения Диазолином® употребление алкогольных напитков не рекомендуется.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности или кормления грудью противопоказано применение препарата.

Дети. Препарат применять детям старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

При применении препарата не рекомендуется управлять автотранспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, которые требуют концентрации внимания.

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

Передозировка

При передозировке препарата повышается риск возникновения побочных явлений, описанных в соответствующем разделе. В этом случае препарат отменить, в случае необходимости провести мероприятия общей детоксикации (промывание желудка, форсированный диурез), симптоматическую терапию.

Форма выпуска

По 10 таблеток в блистере. По 1 или 2 блистера в пачке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Срок годности

3 года.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Название и местонахождение производителя

ПАО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

Торговое название препарата: Дилазол[®]

Действующие вещества (МНН): мебедролон (mebedrolon)

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

1 таблетка содержит:

мебедролон (мебедролон) в пересчете на 100% вещества 100 мг (0,1 г);

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, уксусная кислота, карбофенол, повидон, доэракс, ксантин, стеарат.

Описание: таблетки круглой формы с плоской поверхностью, с риской в форме буквы «П» на одной стороне.

Фармако-терапевтическая группа: миотропные спазмолитики, производные мебедролона.

Код АТХ: R02AX12

Фармакологические свойства

Мебедролон относится к миотропным препаратам, действует непосредственно на гладкую мускулатуру. Мебедролон оказывает спазмолитический эффект, уменьшает тонус гладкой мускулатуры органов пищеварения, а также спазмы мочевыводящих путей. В отличие от миотропных препаратов растительного происхождения (анисовый, фенугreek) имеет менее выраженный седативный и снотворный эффект. Обладает спазмолитическим и миотропным действием и не оказывает седативного действия.

Быстро всасывается из кишечника в кровь. Биодоступность мебедролона в препарате Дилазол[®] (таблетки) составляет 15-30 минут, максимальная концентрация достигается через 1-2 часа. Продолжительность действия препарата составляет 3-4 часа. Дилазол[®] практически не оказывает влияния на сердечно-сосудистую систему, не повышает артериальное давление, не вызывает тахикардию, не оказывает влияния на ритм и проводимость сердца, не вызывает изменения в электрокардиограмме, не вызывает изменения в моче.

Показания к применению

Профилактика и лечение спазмов гладкой мускулатуры органов пищеварения, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, а также спазмов гладкой мускулатуры органов дыхания.

Способ применения и дозы

Дилазол[®] принимают внутрь, после еды, 1-2 раза в день, 12-15 мг на 100-150 мг 1-2 раза в день. Для детей до 12 лет: 1-2 раза в день - 100 мг, 12-15 лет - 150 мг.

Дети 12-15 лет: 1-2 раза в день - 150 мг, 15-18 лет - 1-2 раза в день - 200 мг.

Противопоказания: повышенная чувствительность к мебедролону, беременность, лактация, детский возраст до 12 лет, заболевания печени, почек, сердца, сосудов, гипертония, тахикардия, брадикардия, аритмия, заболевания нервной системы.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: Дилазол[®] может вызывать снижение артериального давления, что иногда проявляется диспепсическими явлениями (тошнота, рвота, боль в эпигастрии).