

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ

Торговое название препарата: Пектолван Плющ

Действующее вещество (МНН): плюща обыкновенного листьев экстракта сухого

Лекарственная форма: сироп

Состав:

1 мл сиропа содержит:

активное вещество: плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (*Hederae heliсis e folium*) ((4-8):1) (экстрагент – этанол 30%) - 7 мг;

вспомогательные вещества: натрия цитрат; кислота лимонная, моногидрат; сорбит (Е 420); калия сорбат; ксантановая камедь; ароматизатор пищевой «Вишня 667» (растворитель пропиленгликоль); вода очищенная.

2,5 мл сиропа содержат 963 мг сахарозаменительного вещества сорбита = 0,08 хлебных единиц.

Описание: прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с запахом вишни и сладким фруктовым вкусом, возможно появление легкой опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяющиеся при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ: R05CA.

Фармакологические свойства

Препарат растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антимикробное действия, обусловленные присутствующими в нем гликозидами (сапонинами). Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.

Показания к применению

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Способ применения и дозы

Применять внутрь с помощью прилагаемой дозирующей ложки.

Младенцам и детям с 1 до 6 лет Пектолван плющ применяют внутрь по 2,5 мл 2 раза в сутки, детям от 6 до 12 лет – по 5 мл 2 раза в сутки, взрослым и детям с 12 лет – по 5 мл 3 раза в сутки.

Сироп нужно принимать утром, днем и вечером.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

В несложных случаях продолжительность лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию еще 2-3 дня после улучшения состояния пациента.

Перед каждым употреблением необходимо хорошо взбалтывать флакон!

При отсутствии улучшения состояния пациента, необходимо обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

Побочные действия

Очень редко (меньше 1 случая на 10000) может проявляться слабительный эффект (в связи с содержанием сорбита). Очень редко (меньше 1 случая на 10000) могут наблюдаться аллергические реакции: одышка, отек слизистых оболочек, высыпания на

коже, крапивница, зуд.

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к активному веществу, растений семейства Аралиевых, или к любому другому компоненту препарата. Непереносимость фруктозы.

Лекарственные взаимодействия

При одновременном применении препарата Пектолван плющ и других лекарственных средств побочного действия не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например, с антибиотиками.

Особые указания

Дети в возрасте до 2 лет должны принимать Пектолван плющ, сироп только под тщательным наблюдением врача в условиях стационара. Длительный или рецидивирующий кашель у детей до 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением. Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом. Сопутствующее применение средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, не рекомендуется без медицинской консультации. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью

В связи с отсутствием данных исследований этот препарат не следует применять в период беременности или кормления грудью.

Дети

Препарат применяют в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Передозировка

Прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать тошноту, рвоту, диарею или тревожное возбуждение. Лечение симптоматическое.

Форма выпуска

По 100 мл во флаконе. По 1 флакону вместе с дозирующей ложкой и инструкцией по медицинскому применению в пачке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Срок годности после вскрытия флакона 90 суток.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

ПАО «Фармак».

Местонахождение производителя:

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

Представительство ПАО "Фармак" в Узбекистане

100000, г.Ташкент, ул. А.Кодырий, 39.

Тел./факс: +99871 235-77-13, +99871 235-67-05.