



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ

Торговое название препарата: Пектолван Плющ

Действующее вещество (МНН): плюща обыкновенного листьев экстракта сухого

Лекарственная форма: капсулы

Состав:

1 капсула содержит:

активное вещество: 52,5 мг плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (*Hederae heliciс e folium*) ((4–8):1) (экстрагент этанол 30 %);

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, мальтодекстрин, крахмал кукурузный, коповидон, магния стеарат;

состав оболочки капсулы: желатин, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), индигогин (Е 132).

Описание: Твердые желатиновые капсулы № 3, корпус капсулы и крышечка – темно-зеленого цвета. Содержимое капсулы – порошок светло-коричневого цвета, содержащий небольшие частицы от светлого до более темного цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяющиеся при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ: R05CA

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антимикробное действие, которое обусловлено наличием гликозидов (сапонинов). Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в сутки.

Длительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях длительность лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию еще 2 – 3 суток после улучшения состояния пациента.

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

Дети. Препарат можно применять детям с 12 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, в том числе сыпь на коже, зуд, покраснение кожи, крапивница, отек Квинке, удушье.

Желудочно-кишечные расстройства, в том числе боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

В случае появления каких-либо нежелательных реакций следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата и растений рода *Araliaceae*.

Лекарственные взаимодействия

При одновременном применении препарата Пектолван Плющ и других лекарственных средств побочного действия препарата не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например, с антибиотиками.

Особые указания

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при отхаркивании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Одновременное применение противокашлевых лекарственных средств, содержащих кодеин или дексметорфан, не рекомендуется без консультации врача.

Осторожно применять препарат пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.

Суточная доза капсул Пектолван Плющ (3 капсулы) содержит 0,00675 ХЕ, что нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Применение при беременности и период лактации

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не влияет.

Передозировка

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, может вызвать тошноту, рвоту, диарею, ажитацию. Лечение симптоматическое.

Форма выпуска

По 10 капсул в блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Фармак»

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ПАО «Фармак»

Узбекистан, 100000, г. Ташкент, ул. А. Кодырий, 39

Тел./факс: 71 235 77 13; 71 235 67 05